



ESTADO DE CONSERVACIÓN
PREOCUPACIÓN MENOR

MAMÍFERO

Zorro culpeo

Lycalopex culpaeus

FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA

> DISTRIBUCIÓN

Habita desde Colombia a Tierra del Fuego. En Chile se encuentra desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

> HÁBITAT

Montañas, praderas, estepas arbustivas, desiertos y bosques. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 4.500 msnm.

> ALIMENTACIÓN

Omnívoros, la mayor parte de sus presas las captura durante la noche, siendo su preferencia los pequeños mamíferos, como: liebres, ratones, vizcachas, conejos y degües. También se alimenta de huevos, aves y frutos dependiendo de la disponibilidad, además de invertebrados, como lepidópteros y coleópteros.

> BREVE DESCRIPCIÓN

Se trata del cánido nativo más grande de nuestro país y el segundo cánido viviente más grande de Sudamérica, solo superado por el lobo de crin o aguará guazú. Tanto las patas como la cabeza son rojizas; el vientre, cuello y boca, blancos; y el lomo, gris rayado de negro. La cola está muy poblada de pelos grises, los cuales se tornan negros hacia la punta. Los especímenes de la zona continental sudamericana pesan entre 7 y 9 kg, pero la subespecie de Tierra del Fuego (*L. c. lycooides*) es significativamente mayor, ya que llega a los 13 kg.

> DATOS CURIOSOS

Este cánido, también llamado zorro colorado o tío Juan (norte de Chile), posee hábitos crepusculares y probablemente esta conducta la mantiene en ambientes donde las temperaturas al anochecer no son tan bajas. Presenta un desplazamiento estacional que alcanza los 15 km lineales. Las hembras son monoéstricas y su época de celo es entre junio y octubre, los nacimientos ocurren entre octubre y diciembre. Una vez que nacen las crías hay cuidado biparental, dependiendo de la disponibilidad de alimento.