



ESTADO DE CONSERVACIÓN
VULNERABLE



AVE

Cóndor andino

Vultur gryphus

FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA

> DISTRIBUCIÓN

Esta especie se encuentra generalmente asociada a la cordillera andina desde Colombia hasta Argentina y Chile. En Chile se distribuye a lo largo de toda la cordillera de los Andes.

> HÁBITAT

Partes altas de la cordillera de los Andes. También se encuentra en las cordilleras próximas a esta y las costas adyacentes de los océanos Pacífico y Atlántico.

> ALIMENTACIÓN

Son carroñeros, se alimentan básicamente de cadáveres de animales.

> BREVE DESCRIPCIÓN

Es el ave voladora, no marina, de mayor tamaño. Puede alcanzar los 3 m de envergadura. Posee una coloración general negra, con plumas blancas alrededor del cuello y en partes de las alas. La cabeza carece de plumas y es de color rojo, pudiendo cambiar de tonalidad de acuerdo al estado emocional que tenga. A diferencia de la mayor parte de las aves de presa, el macho es mayor que la hembra. Los juveniles presentan una coloración parda grisácea, con el cuello y la cabeza oscuros.

> DATOS CURIOSOS

Alcanza la madurez sexual a los 5 o 6 años. Posee una tasa de reproducción muy baja, normalmente coloca un huevo cada dos años. Es una de las aves más longevas, pudiendo alcanzar la edad de 50 años.

Está fuertemente ligado al folclore de los países andinos, aparece en sus mitos, tradiciones y creencias. Es un símbolo nacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Fue declarado monumento natural de Chile por medio del D.S. N° 2/2006 del Ministerio de Agricultura. Es considerado como Patrimonio Cultural y Natural de Sudamérica.

Es una de las especies de los llamados buitres americanos o buitres del Nuevo Mundo debido a que ambos grupos presentan nichos ecológicos similares (son carroñeros). En el año 1912 fue declarada extinta en Venezuela. Pese a esto, existen algunos reportes ocasionales en ese país.